

دراسة مقارنة بين الاغلاق الابتدائي للجرح و الاغلاق المتأخر للجرح في حالات إستئصال الزائدة الدودية المعقدة في مستشفى تكريت التعليمي

م.د.أحمد سليم خزعل .. هندي ... وقصي صبيح رشيد

خلفية: هناك طريقتان متبعتان لإغلاق جرح عملية إستئصال الزائدة الدودية، إما عن طريق غلق الجرح الأولي، أو غلق الجرح المتأخر، والذي يشمل حشر الضماد داخل الجرح لمدة - أيام، ومن ثم يغلق الجرح. ينال الاغلاق الاولي فائدة سرعة التئام الجرح وتفادي الالم المصاحب لتغيير الضماد المكلف ف الهدف من الدراسة: للمقارنة بين حدوث التهاب الجرح بعد اغلاقه عن طريق الاغلاق الاولي والمتأخر بعد عمليات استئصال الزائدة الدودية المعقدة.

: تضمنت الدراسة الحالية مصاباً بالتهاب الزائدة الدوية المعقد (أكال، منفجرة، والخراج) ما بين من الراقيدين في ردهة الجراحة لمستشفى تكريت التعليمي. كان عدد الذكور . تمتد اعمارهم من . كان المشمولين بهذه الدراسة من الذكور البالغين والإناث البالغات غير الحوامل، الذين اجريت لهم عملية إستئصال الزائدة الدودية المعقدة.
: لم تظهر الدراسة فروقا ذات دلالة احصائية لعاملي العمر والجنس على نوع اغلاق الجرح ($p=0.0772$)
 ($p=0.942$ بالتتابع). اذا كان معدل فترة ظهور الاعراض للمرضى الذين اجري لهم اغلاق الجرح المتأخر (. ± . يوماً) وكانت فترة العملية الجراحية لمجموعة الإغلاق المتأخر أطول (. ± . دقيقة) ذات دلالة احصائية ($p=0.021$) وكان معدل فترة رقاد المرضى في المستشفى أقصر (. ± . يوماً) ذو دلالة احصائية ($p=0.030$) (. ± . يوماً).

: كانت النتائج العامة ايجابية فيما يخص اغلاق الجرح المتأخر على الرغم من طول وقت اجراء العملية نسبياً مع الجهد الإضافي المبذول من قبل الجراح. وهذا ما يعطي فوائداً لكل من الجراح والمريض.
الكلمات المفتاحية: التهاب الزائدة الدودية،

البريد الإلكتروني: ahmed.khazaal@outlook.com

تاريخ : تشرين

تاريخ قبول البحث: تشرين الثاني

- كلية الطب - جامعة تكريت - تكريت -
- كلية الطب- جامعة ديالى- ديالى -
- مستشفى تكريت التعلي - تكريت -