

الاسباب الشائعة للالتهابات المهبلية للنساء المصابات بأفرازات مهبلية و المترددات على العيادة الخارجية لمستشفى الولادة التعليمي في أربيل.

زاهدة حارس سعيد^١، نسرين جاسم محمد أمين^٢، رونك علي اسماعيل^٣ و سميرة سليم شيخ محمد^٤

الملخص

خلفية الدراسة: تعد الالتهابات المهبلية من المشاكل النسائية الاكثر شيوعا بين النساء المترددات على العيادات الاستشارية.

اهداف الدراسة: معرفة الأسباب الأكثر شيوعا لالتهابات المهبل لدى النساء في مدينة أربيل.

المواد والطرائق: دراسة مقطعية تم تنفيذها في العيادات الاستشارية لمستشفى أربيل التعليمي للولادة خلال الفترة من ١ تموز/ ٢٠١٥ لغاية ٣١ كانون الثاني/ ٢٠١٦ على عينة مكونة من ١٠١ امرأة في سن الإنجاب اللواتي راجعوا العيادة الاستشارية بسبب معاناتهم من الإفرازات المهبلية. تم اخذ عينة مهبلية من كل امرأة بمساعدة ممرضة، وأرسلت للفحص واختبار الحساسية في مختبر التابع للمستشفى.

النتائج: أظهرت النتائج المختبرية نمو الفلورا الطبيعية بنسبة ٢٩,٧٪ في النساء المشمولات بالدراسة، بينما كان نمو البكتيريا ٢٩,٧٪، نمو الفطريات (المبيضات البيض) كان ٢٢,٨٪ و نمو مختلط (بكتيري وفطري) قد شكل نسبة ١٧,٨٪. لوحظ بوجود علاقة ذات دلالة احصائية ضمن العدوى البكتيرية مع الإفرازات المهبلية للنساء كبار السن ($p = 0.005$)، الإقامة في المناطق الريفية ($p < 0.01$) والنساء الحوامل ($p = 0.03$). من بين عوامل الخطورة الرئيسية لالتهاب المهبل البكتيري، لوحظ ايضا وجود علاقة ذات دلالة احصائية عند استخدام المنتجات غير الصحية ($p = 0.03$)، ومدة الزواج الطويلة ($p < 0.001$).

الاستنتاجات: أن البكتيريا كانت السبب الأكثر شيوعا في حدوث الإفرازات المهبلية مع أو بدون العدوى الفطرية المختلطة.

الكلمات المفتاحية: الإفرازات المهبلية، عدوى المهبل، اصابات بكتيرية، اصابات فطرية، النساء

البريد الالكتروني: zahidaharis@yahoo.com

تاريخ استلام البحث: ١٦ اذار ٢٠١٦

تاريخ قبول البحث: ٢٤ نيسان ٢٠١٦

^{١,٣,٢,٤} مستشفى الولادة التعليمي أربيل - دائرة صحة أربيل - أربيل- العراق.