

نتائج الفحص النسيجي في عينات الرحم المستأصل للنساء اللواتي يعانين من نزف الرحم الغير طبيعي والمراجعات لمستشفى البتول التعليمي للنساء والولادة - بعقوبة - العراق

سارة وليد رحيم^١، أ.م.د. سوسن طالب سلمان^٢ و د. وليد رحيم محمود^٣

الملخص

خلفية الدراسة: نزف الرحم غير الطبيعي يعد واحدة من أكثر المشاكل شيوعا وتحديا بالنسبة لطبيب النسائية وهي السبب الرئيس عن الكثير من زيارات المرضى لعيادات النسائية .

الهدف من الدراسة: تحديد نمط الأنسجة في عينات الرحم المستأصل للنساء اللواتي يعانين من نزف الرحم غير الطبيعي. **المرضى وطرائق العمل:** أجريت دراسة وصفية في قسم التوليد وأمراض النساء في مستشفى البتول التعليمي في مدينة بعقوبة ، خلال الفترة من ١٥ تموز ٢٠١٥ الى ١٤ كانون الاول ٢٠١٥ . انظم للدراسة مجموعه مكونة من ثلاثة وثلاثين من النساء اللواتي يعانين من نزف الرحم غير الطبيعي واللواتي ادخلن لأستئصال الرحم. أعدت ورقة الاستبيان لكل مريضة اذ شملت التاريخ المرضي والفحص الكامل بعد استئصال الرحم وملحقاته ارسلت العينات الى الفحص النسيجي ليتم فحصها بواسطة اخصائي الانسجة .

النتائج: أعلى نسبة من نزف الرحم غير الطبيعي كانت مع الفئة العمرية ٤٦-٥٥ سنة (٥١.٥١%) بينما اقل نسبة كانت مع الفئة العمرية ٧٦-٨٥ سنة (٣.٠٤%)، النساء متعدّدات الولادة كانت لديهن أعلى نسبة من النزف الرحمي غير الطبيعي (٦٠.٦١%) بينما النساء ذوات الولادات القليلة كانت لديهن اقل نسبة (٩.٠٩%). الورم الليفي كانت اكثر نتائج الفحص النسيجي شيوعا في العينات (٤٢.٤٢%) بينما اقل نسبة مئوية كانت مع بطانة الرحم الافرازية (٣.٠٣%). نتائج الفحص النسيجي تباينت مع التقدم في السن وازدياد عدد الولادات.

الاستنتاجات : الورم الليفي يشكل غالبية الحالات التي تحضر إلى المستشفى لاستئصال الرحم تليها بطانة الرحم التكاثرية لذلك يجب أن يتم تقييم كل مريضة تعاني من نزف الرحم غير الطبيعي لمعرفة الأسباب الكامنة ورائها.

الكلمات المفتاحية: نزيف الرحم غير طبيعي، واستئصال الرحم، الورم الليفي، والعمر، الولادات المتكررة.

البريد الالكتروني: hajiasawsan@yahoo.com

تاريخ استلام البحث: ٥ حزيران ٢٠١٦

تاريخ قبول البحث: ٢١ آب ٢٠١٦

^١ كلية الطب جامعة ديالى- بعقوبة- العراق.
^٢ مستشفى بعقوبة العام - بعقوبة - ديالى - العراق.