

## تخريب العصب الداخلي مقابل تقسيم الرباط فقط في جراحة متلازمة نفق الرسغ

د. عبد الرحمن سعيد احمد<sup>2</sup> و د. ياسين ثامر حسين<sup>2</sup>

### الملخص

**خلفية الدراسة:** متلازمة نفق الرسغ هي احتباس العصب الوسطي تحت الضابط الانقباضي للرسغ وهي أكثر شيوعا في الإناث منها في الرجال وتستجيب عادة للطرق التحفظية من العلاج. ويستعمل التداخل الجراحي في حالات الاحتباس الشديد وحالات عدم الاستجابة للعلاج التحفظي.

**اهداف الدراسة:** لتقييم اثر تخريب العصب الداخلي على النتائج السريرية لجراحة متلازمة النفق مقابل تقسيم الرباط الرسغي فقط .

**المرضى والطرائق :** ثمانية وأربعون مريضا يعانون من متلازمة النفق الرسغي المثبت سريريا تم توزيعهم الى مجموعتين , المجموعة (أ) تقسيم الرباط الرسغي فقط ، و المجموعة (ب) تقسيم الرباط الرسغي مضافا له تخريب العصب الداخلي . وقد تم مقارنة المجموعتين بعد التداخل الجراحي على أساس التحسن السريري ولمدة متوسطها أربعة أشهر. وقد تم استبعاد النساء الحوامل ، والمرضى الذين لديهم عملية جراحية سابقة لتحرير العصب في الرسغ نفسه وحالات الضمور الشديد في عضلات الإبهام وسوفان الفقرات العنقية الشديد والمتوسط تم اجراء التداخل الجراحي لجميع الحالات في مستشفى بعقوبة التعليمي للفترة من كانون الثاني 2014 ولغاية آب 2016 .

**النتائج:** جميع الحالات تماثلوا للشفاء من متلازمة نفق الرسغ بشكل كامل او جزئي في كلا المجموعتين ماعدا حالة واحدة في المجموعة (أ) حصل فيها انتكاس واستجابت هذه الحالة للعلاج التحفظي .

**الاستنتاجات:** لم نجد اختلافا ذو دلالة احصائية في النتائج بين المجموعتين اذ تبين ان تخريب العصب الداخلي لا يضيف تحسنا ذو اهمية تذكر لنتائج المرضى الذين يعانون من متلازمة نفق الرسغ .

**الكلمات المفتاحية:** متلازمة نفق الرسغ، تخريب العصب الداخلي .

البريد الالكتروني: dr-saeed8688@hotmail.com

تاريخ استلام البحث: 25 كانون الاول 2016

تاريخ قبول البحث: 14 أيار 2017

<sup>2,1</sup> قسم جراحة الكسور - مستشفى بعقوبة العام التعليمي - بعقوبة - ديالى - العراق.